

XI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Sepsiszentgyörgy, 2002. márc. 16-20.

10. osztály

1. feladat: Egy körön adott 2002 pont, amelyek közül egyet megjelölünk A -val. Az adott pontokkal, mint csúcspontokkal megszerkesztjük az összes konvex sokszöget (háromszögeket, négyszögeket, ...).

a) Melyik sokszögből van több, azokból, amelyeknek az egyik csúcspontja az A , vagy azokból, amelyeknek egyik csúcspontja sem esik egybe az A ponttal?

b) Legyen P annak a valószínűsége, hogy az összes konvex sokszög közül taláalomra kiválasztva egyet, annak az egyik csúcspontja az A . Bizonyítsuk be, hogy

$$\left| P - \frac{1}{2} \right| < \frac{1}{2^{1981}}.$$

Szabó Magda (Szabadka)

1. feladat I. megoldása: a.) Tekintsük a legkisebb olyan ívet, amely tartalmazza az A -t és mindkét végpontját kiválasztottuk! Ha ehhez a két végponthoz hozzávesszük még az A csúcst, és a sokszöget kiegészítjük a kapott háromszöggel, az eredmény nyilván egy konvex sokszög lesz, amely megfelel a feltételeknek. Az is látható, hogy különböző sokszögekből különbözőket kapunk, mivel ez az átalakítás egyértelműen megfordítható: venni kell az A csúccsal szomszédos két kiválasztott csúcst, és a meghatározott háromszöget levágni a sokszögből. Ez azt jelenti, hogy az A csúcst nem tartalmazó sokszögekből legfeljebb annyi van, mint az A csúcst tartalmazókból. Ha viszont veszünk egy A csúcsú háromszöget, annak a fent leírt módon nem tudunk megfeleltetni egyetlen olyan sokszöget sem, amely nem tartalmazza csúcsként az A -t, vagyis az A -t tartalmazó sokszögekből szigorúan több lesz.

b.) Ha kiválasztjuk a csúcsokat, az összekötés sorrendje már egyértelmű, azaz az össze lehetséges sokszögek száma

$$N = \binom{2002}{3} + \binom{2002}{4} + \dots + \binom{2002}{2002} = 2^{2002} - \binom{2002}{0} - \binom{2002}{1} - \binom{2002}{2}$$

Vegyük most számba azokat a sokszögeket, amelyek egyik csúcsa az A pont!

$$N_A = \binom{2001}{2} + \binom{2001}{3} + \dots + \binom{2001}{2001} = 2^{2001} - \binom{2001}{0} - \binom{2001}{1}$$

A keresett valószínűség így

$$p = \frac{N_A}{N} = \frac{2^{2001} - \binom{2001}{0} - \binom{2001}{1}}{2^{2002} - \binom{2002}{0} - \binom{2002}{1} - \binom{2002}{2}}$$

Ebből

$$\begin{aligned} p - \frac{1}{2} &= \left(2 \binom{2002}{2} + 1 \right) - \left(\binom{2002}{0} + \binom{2002}{1} + \binom{2002}{2} \right) = \\ &= \frac{2 \binom{2002}{2} + 1}{2^{2003}} < \frac{2048^2}{2^{2003}} = \frac{1}{2^{1981}}, \end{aligned}$$

és éppen ezt kellett belátnunk.

2. feladat: Határozzuk meg az a paraméter azon értékeit, amelyekre

$$\sqrt{1+x^4} > 1-2ax+x^2$$

egyenlőtlenség minden pozitív x -re teljesül.

Bogdán Zoltán (Cegléd)

2. feladat I. megoldása: Az egyenlőtlenség

$$a > \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} - \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} \right)$$

alakba írható át. Ha most bevezetjük az $y = x + \frac{1}{x}$ jelölést, akkor $x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$ miatt az egyenlőtlenségünk

$$a > \frac{1}{2} \left(y - \sqrt{y^2 - 2} \right)$$

formájú, azaz gyöktelenítés után

$$a > \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 2}}$$

Mivel x pozitív, azért $y \geq 2$, tehát $a > \frac{2}{2+\sqrt{2}}$ esetén az egyenlőtlenség biztosan teljesülni fog, ennél kisebb alsó korlátot viszont nem tudunk mondani, tehát ezek lesznek az a paraméter megfelelő értékei.

3. feladat: Bizonyítsuk be, hogy minden ABC háromszögben érvényes a következő egyenlőtlenség:

$$4T(\operatorname{ctg} A + \operatorname{ctg} B + \operatorname{ctg} C) \geq ab + bc + ac,$$

ahol a, b, c a háromszög oldalainak hosszát, A, B, C a háromszög szögeinek nagyságát és T a háromszög területét jelenti.

Oláh György (Komárom)

3. feladat I. megoldása: Lássuk be első lépésként, hogy

$$4T(\operatorname{ctg} A + \operatorname{ctg} B + \operatorname{ctg} C) = a^2 + b^2 + c^2$$

A koszinusztételből tudjuk, hogy $\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, amiből azt kapjuk, hogy $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc \sin \alpha} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4T}$, átszorozva tehát

$$4T \operatorname{ctg} \alpha = b^2 + c^2 - a^2$$

Hasonlóan megy a bizonyítás a másik két szögre, a három megfelelő összefüggést összeadva pedig éppen a bizonyítandó állítás adódik.

Ezután már csak azt kell belátnunk, hogy $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$. Ez azonban 2-vel szorozva és átrendezve azt adja, hogy $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (a - c)^2 \geq 0$, ami nyilvánvalóan igaz. Ezzel a feladat állítását bebizonyítottuk.

4. feladat: Adott az $n \geq 2$ páratlan természetes szám. Határozzuk meg az

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2} + \sqrt{n^2 - 1}}$$

szám egész részét.

Balácsi Borbála (Beregszász)

4. feladat I. megoldása: Vezessük be a következő jelöléseket:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2} + \sqrt{n^2 - 1}}$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2}}$$

Tudjuk, hogy $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$ bármely n -re, ez pedig azt jelenti $A > B$. Adjuk most össze a két kifejezést, illetve vonjuk ki őket egymásból:

$$A + B = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2}},$$

ami gyöktelenítés után egyenlő

$$-\sqrt{1} + \sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} \pm \dots - \sqrt{n^2 - 2} + \sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2} = n - 1$$

Továbbá

$$A - B = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} - \left(\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} \right) - \left(\frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} \right) - \dots - \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 3} + \sqrt{n^2 - 2}} - \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2} + \sqrt{n^2 - 1}} \right) - \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2}} < \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} < 1$$

Tekintve, hogy $A = \frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}$, azért $\frac{A+B}{2} < A < \frac{A+B}{2} + \frac{1}{2}$, vagyis $\frac{n-1}{2} < A < \frac{n+1}{2}$. Tudjuk továbbá, hogy n páratlan, ami azt jelenti, hogy $[A] = \frac{n-1}{2}$.

5. feladat: Az ABC háromszögben az AM , BN és CP összefutó egyenesek (egy ponton átmenő) (M a BC , N a CA és P az AB oldalon található). Legyen az AM és NP metszéspontja Q . Bizonyítsuk be, hogy, ha a BQM és MQC szögek egyenlők, akkor AM merőleges NP -re.

András Szilárd (Kolozsvár)

5. feladat I. megoldása: Húzzunk párhuzamost az A ponton át a PN egyenessel, jelöljük ezt az egyenest d -vel! Hosszabbítsuk meg a BQ és CQ szakaszokat a d egyenesig, legyenek a kialakult metszéspontok S és R . A párhuzamos szelők tétele szerint $\frac{AS}{PQ} = \frac{AB}{BP}$, továbbá $\frac{AR}{QN} = \frac{AC}{CN}$, amiből azt kapjuk, hogy

$$\frac{AR}{AS} = \frac{AC}{CN} \cdot \frac{BP}{AB} \cdot \frac{QN}{QP}$$

Az APN háromszögben alkalmazva továbbá a Ceva-tételt az AO , BO , CO egyenesekre azt kapjuk, hogy

$$\frac{AC}{CN} \cdot \frac{BP}{AB} \cdot \frac{QN}{QP} = 1,$$

amiből azt kapjuk, hogy $AR = AS$. Ez azt jelenti, hogy a QA egyenes az RQS háromszögben nemcsak szögfelező, hanem súlyvonal is, ami viszont azt jelenti, hogy a háromszög egyenlőszárú, tehát QA egyben magasság, vagyis merőleges RS -re, azaz $NP \parallel SR$ miatt $AQ \perp PN$ is teljesülni fog.

6. feladat: Egy négyzet alakú 100-szor 100-as táblázat minden mezőjébe egy pozitív egész számot írunk. Tudjuk, hogy bármely két szomszédos (közös oldallal rendelkező) mezőbe írt szám különbsége legfeljebb 10. Bizonyítsuk be, hogy van 6 olyan mező a táblázatban, amelyekbe azonos számokat írtunk.

Urbán János (Budapest)

6. feladat I. megoldása: Véges sok számot írtunk be, ezek között mindig van legkisebb, jelöljük ezt m -mel! Legfeljebb 198 lépésben erről a mezőről bármelyikre eljuthatunk, vagyis minden szám legfeljebb

$$m + 198 \cdot 10 = m + 1980$$

lesz, ami azt jelenti, hogy maximum 1981 különböző számot írhattunk be a táblázatba. Annak azonban 10000 eleme van, és ha minden szám legfeljebb ötször szerepelne, akkor összesen $5 \cdot 1981 = 9905$ mezőt tudnánk kitölteni, ami ennél kevesebb. A skatulyaelv szerint tehát lennie kell legalább egy számnak, amely minimum 6-szor fordul elő.